

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十六

詳校官太醫院院使臣張聲基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十六 明

周王朱櫛 撰

嬰兒下痢門

一切痢

總論

夫小兒八痢曰冷曰熱曰疳曰驚曰冷熱不調曰休息
曰滾痢曰蠱毒諸痢無積不能成冷痢白積熱痢赤積
冷熱不調積下赤白疳痢黃白積下無度驚痢青積休
息痢糞黑如魚腸愈而復作滾痢停積不下肚大飲食不

為肌膚氣息大便秘澀疼痛啼叫蠱毒痢下紫黑不可
不詳察略具數方量大小以大方藥斟酌用之 痢與
瀉名雖不同感受之源一也胃為水穀之海其精英則
流布以養五臟其糟粕則傳送以歸大腸葛氏曰內由
腸胃虛冷乳食積滯外因感冒寒熱所傷遂成瀉痢楊
氏曰傷風者自汗惡風痛引腰脊鼻塞項強夾寒者筋
節拘急面慘惡寒傷暑者面垢煩躁渴飲水漿背寒自
汗傷濕者肌肉虛浮身痛重着冷則腸鳴肚冷而手足

清冷熱則煩躁身熱而手足溫熱不調者乍熱乍冷熱積於內者不能去其積徒以冷藥解之熱氣無所發泄故冷熱相搏而下注或冷積於中不能去其滯徒以熱藥壓之冷積不能宣通故冷熱相干而或泄外則傷食一證食飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭夜熱晝涼泄者若脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂脾積而泄也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若風邪夾熱則所下黃而赤焉白者冷搏腸間精凝

滯則白也若寒邪併之則所下白而黑焉冷熱相交故
赤白相半重者狀若濃涕而雜之輕者白涕中間微有
黑縷內挾風邪故清血注毒如腸胃之間則下如豆汁
或有瘀血也 痢頻不食腹脹喘粗下糞如黑澤身熱
渴脉大者皆不可治也 楊氏曰究以受病之源決以
對病之藥大要散風邪行滯氣消積滯開胃脘為先不
可使用肉豆蔻訶子白朮革補住寒邪不可悞投罌粟
殼龍骨榴皮等閉澁腸胃邪氣得補而愈勝腸胃澁滯

則腫脹日久淹延而未愈也至若泄瀉之後腹滿身疼
厥逆是為表裏俱病急與理中湯溫裏仍以桂皮湯解
表活人書已言之泄瀉而面色青慘者肝經受寒寒肝
之賊木能勝土古人慮之特設當歸厚朴湯以活之玄
機論曰大便黑者難瘥痢出於積滯積物積也滯氣
滯也物積欲出而氣滯之不與出是以下墜裏急乍起
乍止日夜頻併多因傷暑伏熱食啖熱毒之物而得物
積用巴豆大黃葶氣滯用枳殼桔梗青皮蓬朮等以黃

連九佐之阿膠九乃大腸虛滑有熱毒留滯則能疎導
無熱毒則能安愈無阿膠九即以當歸青皮赤茯苓黃
連阿膠炒作劑入烏梅濃蜜同煎甚能蕩滌惡穢積滯
既去痢數漸疎調以木香茯苓縮砂白豆蔻陳皮甘草
和胃食後以真人養臟湯易簡斷下湯可止則止下
痢雖曰有積有暑如用藥不效即是腸胃有風邪冷熱
如熱者赤者宜敗毒散冷者白者宜不換金正氣散加
木香下痢壯熱須用敗毒散如陳米飲調五苓散佐

之或下阿膠丸 凡卒暴注下皆因乳食不節脾胃傷胃
濕熱水穀不分洞泄不止夏熱飲水食冷之由多有之
不可便服止瀉及溫煖之劑必成裏急後重成痢積也
凡痢疾不進乳食此乃邪氣疫毒傳入臟腑必成噤口
痢九死一生先當用敗毒散加陳糯米一百二十粒服
經效 傷食痢乃乳哺太飽損傷脾胃不能消化遂成
積痢其證夜熱晝冷氣急發渴目胞腫肚腹硬下痢酸
臭湯氏曰此瀉難止亦不宜補當應紫霜丸或五積丸

白湯下取其積虛者調消積飲吞下補脾止痢消積飲
同益黃散煎縮砂湯調服 熱血痢裏急而痛已疎通
而下吐乃榮血虧少當於藥中以川芎為佐以調榮血
凡小兒患痢之時未熱久積氣虛其臟腑虛急作熱
此屬惡候終見痢後作熱此兒臟腑虛弱同於虛熱主
治其或三焦熱引飲不歇四肢浮腫者理宜溫補臟腑
散除濕氣喘則難治凡痢熱疳熱吐瀉熱不可發散退
熱不佐寒涼藥但理其病源調其臟腑和其榮衛生其

胃氣令進飲食加與痢藥服之參酌赤白多少膿血相
雜裏急後重用行血後腸胃和中脘溫臟腑其熱自然
退愈凡小兒患痢不問輕重忌葷腥冷熱炙煨醃醢應
毒之物若恣口腹愈而復作若要永安須用戒絕之矣
赤痢當用黃連地榆罌粟殼阿膠等藥白痢當用乾
薑訶子龍骨人參豆蔻等藥赤白痢當用沒石子黃連
豆蔻噤口痢治當用先助胃壯脾漸能入食始用木香
橘皮等藥若更虛弱加以附子依此調理數日飲食頗

進漸有黃糞夾雜脾胃漸能充化當以去積藥下之若
據幼幼新書皆用編銀丸今之小兒非上古稟受之比
久痢腸胃已薄豈宜用膩粉等藥以取之若執方反成
大害余治痢之法若欲取積只用官局進食丸甚穩雖
取積而又能治痢萬無一失積已下而急以四君子湯
加豆蔻訶子補之常服厚腸香丸此得效之法然當斟
酌恐孩兒有虛實又當隨機變化虛極者加以附子之
屬凡痢久則冷腫滿下焦偏令上焦熱結熏蒸於肝

則眼昏生翳古今八痢者因觸八邪所得故名八痢八邪者飢飽勞疫風驚暑濕八般痢者強而為名其實皆冷熱所作也下痢舌黃燥不渴胃中實熱腹滿身熱譫語者復有燥糞大柴胡湯下之後與瀉腸痢藥如覺有食積或久痢不退先補脾次與妙靈丸下之後再補脾胃若下痢者舌白而渴小柴胡加罌粟無如此妙也大柴胡湯亦宜加之虛腫者女麴散痢後成疳眼生翳者六甲丸并溫平疳藥治之

楊達押綱子五歲七月中患痢自與治不退召愚視之見

兒攢眉乃痢之後作煩主人問兒欲思酒可與否遂問
兒平日曾飲酒曰不曾飲痢忽思酒時欲飲之荅曰此
病不治素問云病不治者治之無功蓋痢欲思酒者是
大腸已虛津液已枯榮衛不能相滋是猶日薄西山無
住之況主人怒曰兒病方十餘日久又能食而不熱證
候平穩何相駭也若果不能治幾日當絕荅曰今未絕
直候兒蕪藥食喉中鳴响三日內涎潮肺絕當卒有氣
急者五日不退再七日而死矣肺與大腸為表裏表裏
俱絕即死正如齊侯抱將死之疾怒扁鵲之先見也乃
長揖而退楊別易數醫旬日病雖不退皆言不妨忽一
日咽湯飲喉中鳴响再告召愚楊慚對曰果如君言能
救之否荅曰不可果三日內涎潮而卒後楊請問此二
証出何書而說死荅曰諸書皆不載歷試三十年累見
斯証試之多驗故敢言不治也知縣冷世修子三歲
八月中患膿血痢累醫作食痢或作暑痢或作疳痢或
用感應丸或用胃風湯紫丸子下之并雜藥共治五十餘

日皆無應效召愚視之其証面黃憔悴多睡露睛溫熱
溫疼大便黧血或如豆汁雜色腥臭愚曰病久可危可
喜者面白而不昏是形氣相得色黃而滋潤是色澤以
浮脉沉而有力是脉從四時素問曰形氣相得謂之可
治也澤以浮謂之易無脉從四時又手足不冷雖危可
治蓋此病脾胃有風虛中有積前後醫者雖以胃風湯
主風下氣紫九子下積滯猶在所以進退日久也問曰
何知有風積錢氏曰多睡露睛身溫風在脾胃故大便
不聚孫氏曰大便雜色米穀不化腥臭肥膩虛中有積
或腸中沉冷今用四君子湯胃風湯四物湯此三藥助
氣和胃調脾活血共治五日日各二服次與宣風散連
進二服令微利去脾間風再進前藥二日空心與妙靈
丸一服去沉積瀉數行再四君子湯加訶
子末一日六服後用訶子膏駐車治愈

方

大效至聖千金飲子

活幼口議

治小兒脾積虛痢下五色先

由嘔吐復作泄瀉臍腹痛脇肋脹滿受濕虛鳴膿

血相雜下如豆汁亦如瘀血日夜無度食少羸瘦宜

服

綿黃耆

蜜炙

甘草

陳皮

罌粟

炙

木香

白芍

地榆

川當歸

枳殼

麩炒

黑豆

炒

烏梅

淮棗

白朮

訶子

炮去核

黃連

右等分咬咀每服一錢水一小盞煎半盞去滓通口

與服

議曰臟腑虛中加燥故患熱痢或爾虛寒或患冷痢或有暑氣冒之水穀不分或受濕氣臨之腸胃有作因食毒傷觸脾肺或因宿冷停積臟腑或因表裏不解因冷熱相承或因飲過多或因飲饌不及多食醃鹹常噉魚腥或是母懷胞胎恣其口腹積之日久氣不宣通遂令患疾有加發作無度畢竟腸胃虛損日夜呷冷痢下頻併宜服此方效驗

生熟飲子

活幼口議

治嬰孩小兒虛積痢腹肚痛寒裏急後

重日夜無度

嬰粟殼

大者四箇一半炙此一味去盡內瓣及筋蔓者佳

陳皮

二片半炙

甘草

二寸

烏梅

兩箇半煨

淮棗

二箇半煨

生薑

二塊指大半煨

木香

一兩作兩

片半

訶子

大者二箇一半煨

黑豆

六十粒半炒

黃耆

二寸半炙

白朮

二塊大半煨

當歸

二寸半煨

右件各半生熟咬咀和勻每服三錢水一盞入磁瓶內煮濾去滓任意與服至多勿慮所有生黑豆不要

破只完全同煎效

議曰病有冷熱藥有生熟病有陰陽藥有造化病有虛實藥有君臣按君臣以理虛實分生熟而均冷熱治療主本之法也平和腸胃之方也順益三焦之功也安調五臟之至也陰陽既分冷熱既散腸既厚三焦既益五臟既順良由藥有造化且水穀自分榮衛自正糟粕自去治其瀉與痢何患不愈生熟飲子之功乃盡天下之妙不可忽

澤漆茱萸湯 治小兒夏月暴寒寒入胃則暴下如水
四肢被寒所折則壯熱不除經月許日變通身虛滿
腹痛其脉微細服此方一劑漸漸安神

澤漆

青木香

海藻

各二分

吳茱萸

茯苓

白

朮

桔梗

芍藥

當歸

各三分

大黃

一分

右咬咀以水四升煮取一升半一百日至一歲兒一
服二合半一歲已上至二歲一服四合

養臟湯

治冷熱不調泄瀉裏急後重

木香 白芍藥各八分 訶子肉錢三 人參 白朮 當

歸各三錢 甘草炙 肉桂各四錢 罌粟殼去筋蔓蜜炙一兩

右判薑棗煎服

生金牛黃湯 治小兒積下不止因發癇

生金三銖一方用六銖無生金用熟亦得法用作屑今方盡成器者 牛黃三銖 麻黃

二分 黃連 乾薑 人參 甘草各一分 細辛半

右㕮咀以水一升六合煮取八合去滓臨卧服研牛黃以煮湯中如兒熱者用生薑代乾薑今世之生金

但用成器金亦善二三兩皆得用也

胃風湯

全嬰方

治小兒風冷乘虛客入腸胃水穀不化洩

瀉注下胸脇虛滿腹鳴肚疼及腸胃溫毒下如豆汁
或下瘀血日夜無度身熱不食

人參

白茯苓

去黑皮

白朮

白芍藥

當歸

焙川

芩

官桂

去粗皮

粟米

少許

右等分為末三錢水半盞煎三分空心日二服量大

小加減

訶子湯

醫方大成

治冷熱不調泄瀉裏急後重

訶子肉

炮

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白朮

各一兩

木香

炮

陳

皮

去白

甘草

炙

肉豆蔻

各等分

右為末薑棗煎服手足厥冷加附子

梅肉散

醫方妙選

治渴痢不止眼生翳障身體浮腫

烏梅肉

炒

綿黃耆

乾葛

各一兩

川黃連

瓜蒌根

乾薑

甘草

各半兩

右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓隨時服

厚朴丸 治小兒臟腑怯弱風冷邪氣客之令兒腹脹
氣不宣通甚者變為下痢

厚朴

薑汁炙

丁香

木香

白朮

各一兩

青皮

去白半兩

牽

牛子

一分炒

湯下

右為細末煉蜜搗成膏如黍米大每服十粒煎陳米

木沉香

醫方妙選

治証同前

木香

沉香

益智

各一兩去皮

草豆蔻

麝香

蓬朮

白豆蔻

各半兩

右為細末每服一錢水八分生薑三片煎至五分去

滓溫服

丹砂丸

聖濟總錄

治小兒一切痢疾

丹砂

研半錢

砒霜

研半錢

巴豆霜

研

硫黃

研

麝香

研

棗

豆粉

研各一分

右細研令勻燒飯為丸如豆大每服二丸血痢煎黃芩湯下白痢煎附子湯下疳痢蛤粉湯下

龍骨丸

一名香連丸和劑方

治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不

化腹痛腸鳴或下膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變成疳

龍骨 白石脂 乾薑

炮

黃連

去鬚微炒

白礬

煨各半兩

右為末醋煮麪糊和丸如麻子大每一歲兒服十九米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量大小加

減日三四服

益黃散

儒門事親

治小兒一切痢冷熱不調泄瀉裏急後重

脾胃虛弱腹痛泄利不思乳食嘔吐不止困乏神懶
心脇膨脹顏色青黃懨懨不醒

陳皮

去白

訶子肉

丁香

甘草

炙

青皮

去穰各等分

右為末米湯調服 楊氏曰本用青皮陳皮太疎利
宜加肉豆蔻去青皮久痢由腸胃虛冷滑泄下痢嬰
粟訶子龍骨等皆澁腸止痢之藥必先以縮砂湯下
感應丸去積等劑候其積消方可服此粟殼本用治
嗽今用治痢功能澁氣令人滿悶不食能消息去之

尤為妙也一方水煎服

梅煎散 治小兒暑毒下痢煩渴肚疼發熱

赤芍藥 黃連 甘草

各一兩

罌粟殼

三兩

右為末三歲一錢水半盞烏梅一箇煎三分去滓食

前服

訶子膏

全嬰方

治小兒新久痢煩渴不食

訶子

炮

赤石脂

甘草

罌粟殼

炒等分

右為末煉蜜丸鷄頭大每服一九米湯化下

豆蔻散

活幼口議

治嬰孩小兒腸胃虛弱糟粕不聚泄瀉不

止或赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發宜服殭

腸豆蔻散良方

肉豆蔻

火煨一箇

胡粉

炒二錢

龍骨

生一錢

白礬

枯一錢

右為末每服一錢溫飯飲調服不拘時薄糊丸如麻

子大五十丸

議曰胡粉即真鉛粉也以鉛法造出韶州名韶粉定

州名定粉總名光粉其性殭故用之以滯其腸令不

虛滑豆蔻溫臟之藥安和腸胃龍骨白礬瀝腸止痢
所患大腸虛滑下痢日夜無度者隨時痊癒一應瘡
腥之物醃醃之屬悉與禁止亦治秋間白痢至效

白餅子

活幼口議

治小兒秋痢號曰毒痢純下白膿肚痛

白礬

枯白淨

膩粉

一錢重

白麪

半兩

胡粉

炒一分

右件和勻水搜作餅如錢大每服半餅大者一餅飯
飲磨化

議曰秋氣金旺則母虛矣夏月火燥則子虛矣夫人

五臟六腑乃循四時而行故曰秋溫脾胃若胃口有
毒禁閉不食輕粉却毒次用豆蔻麪喫兼雞清生熟
飲子間服開胃醒脾乃愈

等住丸

出危氏方

治瀉瀉并一切瀉痢立效

當歸 硫黃 牡蠣

煨

木香

各一分

右為末麪糊丸粟米大每服二十九丸糯米飲入薑汁

三滴送下

小駐車丸

出危氏方

治小兒冷熱不調或乳食失節泄瀉不

止或下痢鮮血或赤多白少腹痛裏急後重腸胃虛滑便數頻併減食困倦一切泄痢並宜服之

當歸

二兩

訶子

炮去核
一兩

乾薑

炮

黃連

去鬚各
三分

右為末用阿膠一兩三分煎成汁搜和為丸如粟米大每一歲兒服十粒至二十三十粒溫米飲下隨乳亦得更量歲數加減與服一方無訶子醋糊丸

草壘飲

出仁
存方

治小兒新久痢疾不食身熱

木瓜草

一兩一方
作馬齒莧

罌粟殼

甘草

各半
兩

右吹咀三歲一錢水半盞煎三分去滓食前服

神效雞清丸

醫方大成

治嬰孩小兒一切痢疾久瀉無時度冷

瀉白痢

木香

錢二

土黃連

一分去麋

肉豆蔻

一箇大者生用

右三味先碾為麁末取雞子清搜藥作餅於慢火上炙過令黃色變紅者稍乾擘破碾羅為末白麪糊丸麻子大每服三五丸溫米飲下一方以黃連半兩用茱萸一分同炒令紫色去茱萸不用肉豆蔻半兩

煨木香一分用雞子清糊丸如麻子大每服五丸飯
飲下赤痢粟米湯下白痢厚朴湯下名木香丸一方
粟米飯為丸如米粒大米飲下治泄瀉陰陽不調腹
痛腸鳴豆蔻木香丸治泄瀉痢赤白

議曰木香黃連一陰一陽藥木香善導水利氣脉黃
連厚腸胃二味君臣相佐陰陽相順加之豆蔻溫和
臟腑止瀉痢功效彌良凡兒患瀉與痢不問證輕重
並宜首先與服不問臟腑冷熱愈多愈效然雞子清

為物有毒是以毒氣引藥致效若去此一味其功不作矣

治惡痢家傳方

湯氏方

南沒石子

豆蔻

各等分

右於砂器上磨水煎數沸服之肚疼加木香血多加

臘茶此乃備急妙方

香連丸

湯氏方

厚腸胃除餘積

黃連

一兩一半生一半熟茱萸炒

木香

半兩炮

右為末化蒸餅丸如黍米大湯下一歲十九大小以意加減一方煉蜜丸治冷熱痢

橘薑湯 治小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之

橘皮 生薑

各三分

右切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

烏賊骨散

全嬰方

治小兒痢肚疼後重

用烏賊骨為末三歲半錢米湯調下一名海螵蛸

炒雞子方

危氏方

治休息痢疳瀉日久不能安者兼小兒

痢日夜數十行者遷延日月百藥俱試飲食不方便

下痢不止百用百中無不獲安神效

昔項文學從龍在臨安見鄉人

潘省幹之子方三歲有此證服之效

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大鉚內以雞子

拌和炒熟空心食之一方雞子白和釀醋攪如白酒

煎如飴灌之勿令吐一方用黃脚雞子和蠟作煎餅

與兒食之止痢

治小兒水痢形羸不勝大湯藥

用白石脂半兩研如粉和白粥空腹食之

治小兒痢

用林檎構子杵取汁服以意多與服之瘥

乳母方

肘後方

用菹豆莖一升炙令為炭切之人參三兩以水三升煎取一大升去滓取汁煮粟粥與乳母食良常食仍復乳勿令住又法乳母常食粥仍欲乳母先捻去少

許即當住

療小兒三歲即患痢初患膿少血多四日後膿多血少

日夜四十餘行

肘後方

用生地黃汁五小合入羊腎脂令煖分三四服立效

預知丸

傳氏活嬰方

治一切痢疾

預知子

一錢去殼別研

訶子

二錢煨去核

木香

半錢

白附子

半錢海

金沙

半錢炒

石決明

二錢煨研

肉豆蔻

一錢

右為末冷水滴丸如菜豆大每服二十九丸藿香湯下

調中散

傅氏活嬰方

治下痢純白

人參

錢一

白茯苓

錢一

白朮

煨

木香

御米

穉豆

藿香

錢各一

訶子

二箇煨

甘草

石蓮肉

錢各一

右為末每服一錢陳米飲下或甘草湯下如和氣紫

蘇木瓜湯下吐瀉氣虛不食頭汗不止鹽湯下胃氣

虛弱嘔吐腹脹陳皮湯下盤腸氣痛木瓜鹽湯下一

方加丁香枳殼薑澄茄肉豆蔻四味尤佳

治小兒肝受疳氣相刑於脾所下之痢多是鮮血忽是

膿血忽赤白相雜宜喫此方

楊子建萬全護命方

防風 地榆

白蒺藜

去刺

川芎

各一錢

史君子

半兩蒸四

五回焙乾

木香

甘草

各三銖

黃連

四銖

右為末每服一錢半無時食後任意煎冷服

香連丸

儒門事親

木香

訶子肉

麩炒

黃連

炒已上各半兩

龍骨

二錢

右為細末飯丸如黍米大每服二十九丸米飲湯下

硃砂丸

楊氏家藏方

治小兒一切泄瀉痢疾

硃砂

半錢

人言

半錢

黃丹

三錢

右為細末水丸粟米大每服五七丸乾薑甘草湯下

雞子湯

肘後方

小兒病食不消腹滿下痢

用亂髮如雞子一枚去垢咬咀之雞子七枚去白以黃并髮煮雞子汁熱數按之令汁出取服

治小兒下痢腹大且堅方

千金方

用故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服

又方

以腹上磨垢衣中白魚服之亦治陰腫

胡粉散 治小兒下痢日夜頻併

龍骨

胡粉

炒焦研

白礬

枯飛過

黃連

去鬚四味各等分

右件為細末每服半錢溫米飲調下乳食後空心服

烏頭丸

鮑氏方

川烏

一箇分三片一生一炮一燒灰存性

右為末蜜丸菜豆大一日服一粒二日服二粒三日

三粒

正氣調胃散

活幼口議

治嬰孩小兒八種虛痢作熱或吐或

瀉發熱霍亂上下氣不復常心虛煩悶等作熱並不

可加用寒涼之藥宜與服此方正氣調胃散兼生熟

飲子如不納食宜服分氣紫蘇飲子

半夏

一兩洗去滑七次

白扁豆

炒

藿香葉

陳皮

各一分

薏

苡仁

炒半兩

甘草

炙半兩

白茯苓

白朮

各半兩

厚朴

一兩

生薑和皮二兩搗壓在鉢中二三宿常番轉取土日曝乾火炒焦

右為末每服一錢水一小盞生薑二片棗二枚煎如

氣未復不納食分氣紫蘇飲四君湯打合服

議曰吐瀉作熱皆由陰陽不順邪正相干臟腑不和
上吐下瀉又有只吐不瀉者又有只瀉而熱者皆是
運動真氣上下不升降又吐瀉俱作曰霍亂其兒陰
陽二氣不正臟腑愈虛且瀉加之盛也不爾風生作
疾候變即慢脾風病家不知其理醫工當究其詳古
人不述其微致後學必招利害今之吐瀉痢瘡熱自
裏虛發作豈可解利其表若要攻裏由虛生熱循此調

理可得其宜大小一同輕重盡善至理之言明智可

鑒

止小兒下痢

本草

用紅蜀葵葉炙煮食

治小兒熱毒下痢

以黃柿和米粉作糗蒸與小兒食之良

治小兒患秋痢與蟲

本草

以棗食之良

療小兒秋痢

本草

以柿研先煮粥熟即下柿更三兩沸與小兒飽食并

乳母喫亦良

一切痢久不瘥

附論

夫小兒一切痢者痢色無定或水穀或膿血或青黃或赤白變雜無常相兼而下也此皆乳母哺食不調冷熱交爭經久則脾胃虛弱連滯不瘥令肌體羸瘦也

方

人參散

聖惠方

治小兒痢久不瘥腹痛多渴

人參

半兩去蘆頭

桔梗

三分當歸

三分微炒

烏梅肉

一分微炒

地榆

三分微炙

艾葉

半兩微炒

黃耆

半兩

龍骨

一兩

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計

時候量兒大小分減溫服

神效散

楊氏方

治久痢并血痢不瘥

赤石脂

一兩煨

白龍骨

一兩

阿膠

二兩

訶子肉

半兩

木香

半兩煨

黃連

半兩

乾薑

半兩

甘草

半兩

右為細末煎粟米飲調下大小以意加減一方有縮

砂仁一兩

當歸散

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥腹痛羸瘦不欲飲

食

當歸

三分

阿膠

三分搗微炒

人參

半兩

黃芩

三分

甘草

一分

炙微赤

龍骨

三分

右為細散每服一錢粥飲調下或半錢日三四服量

兒大小加減

木香散

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥脾胃氣虛飲食全

少腹脹無力

木香

半兩

白礬

二兩燒令汁盡

黃連

半兩去鬚微炒

龍骨

三分

桃白皮

半兩微炙

麝香

一錢細研

右為細散不計時候粥飲調下半錢量兒大小加減

青金散

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥

定粉

二兩

黃丹

半兩

白朮

一分

白礬灰

半兩

白龍骨

半兩

訶梨

勒

一分

右為末用棗一升去核共藥都搜作團入甕罐內盛燒令通赤取出細研為散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小加減

定痢丹

醫方妙選

治下痢久不瘥

蜜陀僧 白礬 定粉 黃丹

已上四味各一兩以新瓦器盛紙筋

和泥固濟文武火燒令赤候冷取出次用

龍骨 黃連

各一兩為細末

右研勻粟米飯搗成膏如黍米大每服五粒至七粒血痢黃連湯下白痢阿膠湯下相雜米飲下大小加

減

鹿角散

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥

鹿角

一斤 定粉

兩

蜜陀僧

黃丹

白礬

各半兩

右入瓶內燒令通赤放冷取出細研為散每服以粥

飲調下半錢日三四服量大小加減

黃丹散

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥

黃丹

葶藶子

黃明膠

各半兩

青州棗

三十枚去核

右搗為團燒令通赤放冷搗羅為散每服米飲調下

半錢日三四服量大小加減

蜜陀僧散

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥日夜度數無恒

蜜陀僧

一分

定粉

一分

黃丹

微炒

龍骨

各一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

妙靈丸

全嬰方

治小兒久患惡痢裏急後重并滑腸洩瀉

虛中有積

硃砂

一錢

辰砂

一錢

右研細以黃蠟半兩先於蓋內鎔成汁入去皮巴豆
三七粒煎巴豆紫色取巴豆入煎二味再研和於蠟
內三分中取一分再成汁傾藥在內急攪合劑刮出
磁盒內收丸小豆大三歲二丸洩瀉惡痢艾湯送下
水瀉冷水下食前取積增丸數冷甘草湯下臨卧服
定粉丸

聖惠方

治小兒一切痢久不瘥

定粉 砒霜

各一分

右同研為末以麪糊丸如黍米大每服以冷漿水下

二九量大小加減

粟房散

全嬰方

治小兒久痢不食

生柏枝

罌粟殼

土炒

右為末三歲半錢米湯調下

枳實散 治小兒久痢淋瀝水米穀不調形羸不堪大
湯藥者

用枳實二兩治下節一二歲已上飲服方寸匕若兒
小以意斟酌日三服

治小兒久痢不效并無辜瀉痢不止

肘後方

用沒石子二箇切炒令黃色研作餛飩食之一方和麪作餅子燂熟為末不計時以粥飲下半錢大小加

減

定粉散 治小兒瀉痢腸滑日久

定粉

一兩炒

蜜陀僧

四錢

烏賊魚骨

一錢

右為細末每服半錢米飲調下

治久痢手足逆冷服藥不效

用四君子湯二錢磨肉豆蔻水八分生薑一片棗半枚加炮附子數片煎服重者加白薑丁香五歲以上水半盞加藥末大小以意加減

烏龍散 治小兒吐後瀉痢久患不瘥大腸滑泄

龍骨 黃丹 定粉 猪指甲子

各等分

右味同入磁罐子內安藥以物塞口用火煨令通赤放冷取出研為細末每服半錢米飲調下

鍾乳益黃丹 治小兒久痢不止及食積作瀉疳氣腹

滿不食

定粉 黃丹

鍾乳粉

煉成者

丁香

石榴皮

炒焦各半

兩 巴豆

七粒去殼同定粉黃丹三味研勻水和作一塊陰乾如豆瓦上熟炭火煨紅出毒一

宿研細

人參

去蘆頭二錢半次用

益智子仁

半兩

硃砂

別研二錢半

木

香

七錢半

白豆蔻

三兩

訶子

煨去核七錢

黃連

四錢

烏梅

十枚取肉

炒

右件為細末煮麪糊為丸如黍米大每服十五丸加至二十九煎木瓜陳皮湯下空心服

黃連散 治痢久腹痛夜行頻併

大黃連

一兩切用吳茱萸等分炒去茱萸

人參

半兩

木香

三錢

右等分每服一錢陳米飲下

女麴散 治小兒因久痢退後脾虛浮腫狀若水氣

乾薑 細辛

椒目

附子

炮去皮

桂心

各等分

右為末三歲一錢酒調下陳皮湯亦得

久痢羸瘦

附論

夫小兒久痢羸瘦者由乳食不節臟腑風挾疳氣腸胃

冷熱不調變為下痢經久不瘥則脾胃虛弱穀減少血不榮故令肌體羸瘦也

方

雄黃散 治小兒久痢不瘥羸瘦壯熱毛髮乾焦不能

飲食

雄黃 蘆薈 研細 青黛 研細 硃砂 研細 當歸 白芷 熊

膽 研細 龍膽 去蘆頭 黃連 去鬚 微炒 黃蘗 剉 甘草 炙 麝香

研細 辛 已上各一分 蚱蟬 七枚 去足 乾蝦蟆 一兩 塗酥 炙令黃焦

右為細散入研藥更研令勻每服以井華水調下半錢日三四服量大小加減

桔梗丸 治小兒久痢不斷肌體羸瘦食不消化

桔梗

一兩去蘆頭

神麴

一兩炒

麥蘖

半兩炒

烏梅肉

半兩炒

黃

連

一兩半去鬚微炒

厚朴

去粗皮薑汁炙令熟

白朮

人參

去蘆頭

赤

石脂

黃芩

甘草

炙

龍骨

桂心

各一兩

黃雌鷄骨

一具淨洗去肉酒浸一宿炙黃

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服以粥飲下五丸

日三四服量大小加減

蕪荑散治小兒久痢羸瘦春夏秋不瘥

蕪荑

一分
微炒

子芩

半兩

黃蘗

微炒

赤芍

厚朴

去粗皮
薑汁炙

人參

去蘆頭
各半兩

阿膠

一分搗碎
炒焦黃色

地榆

三分
微炙

當歸

三分
微炒

右為麤散每服一錢水一中盞入銀一兩薤白一莖

生薑一片棗一枚豉五十粒煎至五分去滓不計時

量大小加減溫服

草菓飲治痢後浮腫

厚朴薑製 草薢煨去 藿香洗 甘草炙 丁皮 乾薑

半夏各半兩

右為散每服二錢棗子同煎如瘧疾脾胃虛弱並宜服之

暴痢附論

夫小兒暴痢者由腸胃虛卒為冷熱之氣所傷而為暴痢熱則色黃赤冷則色青白若冷熱相交則為赤白痢也

方

胡黃連散 治小兒冷熱氣不和忽暴痢腹內疼痛

胡黃連 母丁香 桂心 木香 各一分 犀角屑 半

肉豆蔻 去殼 當歸 微炒 麝香 細研各等分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小

加減

甘草散 治小兒暴痢

甘草 炙 厚朴 去粗皮薑汁炙令香熟用各三分 人參 去蘆頭 黃連 去

微炒各
半兩

龍骨

一兩
白茯苓

半兩

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計
時量大小加減

乾薑散 治小兒暴痢腹痛不食

乾薑

一分
炮

人參

三分
去蘆頭

甘草

一分
炙

訶梨勒

半兩
煨用皮

厚朴

半兩
去粗皮
薑汁炙香熟

右為麤散每服一錢水一小盞入薤白一莖煎至五
分去滓不計時量大小加減溫服

龍骨散 治小兒暴痢

龍骨

一兩 枳殼

半兩 麩炒

當歸

半兩 炒

黃連

一兩 去 鬚微炒

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時量兒大小分減溫服

治小兒暴痢

用小鯽魚一頭燒末服之亦治大人痢

又方

燒鯉魚骨末服之一方作龍骨一方用小鯽魚尾燒

灰以粥飲調服半錢

又方

用赤小豆末酒和塗足下日三度油和亦得

胃風腹脹泄痢

附論

夫小兒肌膚腸胃脆弱若解脫不時風邪易侵客於肌肉搏於胃經則為胃風其肚腹善滿食寒則泄痢瘦而腹大蓋足陽明胃之經其支者起胃下口循腹裏下至氣衝故風冷入腹中善脹大又胃為水穀之海得寒則

食物不化氣血損故痢而形瘦也

方

厚朴散 治小兒胃風腹脹泄痢脾胃氣不和羸瘦食

少

厚朴

去粗皮薑汁炙令香熟

人參

各三分

肉豆蔻

去殼一枚

乾薑

炮製

半兩 訶梨勒

皮煨用

白朮

黃連

去鬚微炒

地榆

微炙各一分

甘

草

炙半分

右為散每服以粥飲調下半錢食前日三四服量兒

大小加減

厚朴散 治小兒腸胃風冷泄痢水穀腹脇脹滿不欲

飲食

厚朴

去粗皮薑汁炙香熟

黃連

去鬚微炒各半兩

丁香

肉豆蔻

去殼

當歸

微炒

木香

龍骨

白朮

各一分

右為散每服半錢以粥飲調下食前日三服量兒大

小加減

訶梨勒湯 治小兒胃風腹脹得冷則泄痢并冷熱痢

腹痛

訶梨勒

煨用皮

當歸

微炒

黃連

去鬚微炒各一兩

甘草

炙

木香

乾薑

炮各半兩

右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓放溫不計時量兒大小分減服之

訶梨勒散

一名厚朴散

治小兒胃風泄瀉兩脇虛脹腹痛不

欲食

訶梨勒

煨用皮

厚朴

去粗皮薑汁炙香熟

當歸

微炒

枳殼

麩炒微

黃去穰

赤芍藥

各等分

右為散每服半錢米飲調下日三服量兒大小加減服之

白朮湯 治小兒胃風泄痢不止腹脹羸瘦

白朮

三分

赤茯苓

去黑皮
一兩

當歸

焙半
兩

人參

一兩

厚朴

去粗

皮薑汁

灸半兩

右搗篩每服一錢水半盞生薑二片煎至三分去滓帶熱服至夜三四服量兒大小加減

調中湯 治小兒胃風下痢水穀不止羸瘦腹脹不欲

飲食

厚朴

去粗皮薑汁炙香熟

黃連

去鬚微炒各一兩

木香

半兩

右搗篩每一錢水七分煎至四分去滓不計時量大

小加減

冷熱痢

附論

夫小兒先因冷食有氣在腸胃之間而復為熱氣所傷此腸胃虛故受於熱冷熱相交而便下痢乍黃乍白或

水或穀是冷熱痢也

方

犀角散

聖惠方

治小兒冷熱痢不止腹痛心神煩悶

犀角屑

白朮

黃連

去鬚微炒

地榆

當歸

微炒一兩

右為粗散每一錢水一小盞煎至五分去滓放溫不計時量兒大小加減

石榴皮煎

聖惠方

治小兒冷熱痢不止

醋石榴皮

三分炙焦

黃連

三分去鬚微炒

赤石脂

二分

右為粗散以水二升煎至五合去滓內臘一兩煎三五沸不計時溫服量兒大小加減

當歸黃連丸

聖惠方

治小兒冷熱痢心神煩渴腹痛脅膈

滯悶

黃連

二兩去
鬚微炒

當歸

一兩
微炒

烏梅

一兩
微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時以粥飲下七丸

量大小加減

訶梨勒丸

聖惠方

治小兒冷熱痢

訶梨勒

二兩煨用皮

地榆

一兩炙微赤

右為末煉蜜丸如菴豆大每服以溫粥飲下五九日三四服量兒大小加減

冷痢

附論

凡痢皆為乳食不節傷動胃氣腸胃虛弱清濁不分因虛而泄滯久不散故為痢也虛而冷者則所下青白或如凝脂久不瘥則陳寒痼結或下黑瘀血診其脉沉而遲者冷痢也

方

訶梨勒散 治小兒秋後大腸挾冷下痢不止

訶梨勒

煨去核
半兩

肉豆蔻

去殼
二枚

當歸

焙

赤石脂

蜜

陀僧

別研
如粉

枳殼

麩炒

龍骨

乾薑

炮

厚朴

去粗皮薑
汁炙各半

兩

右為散三歲兒每服半錢米飲調下空心午後各一服量大小加減

實腸散 治小兒冷痢腸滑下痢頻數

厚朴

薑汁炙
兩半

肉豆蔻

訶子肉

煨

縮砂仁

陳皮

去
白蒼朮

炒
茯苓

各一
兩

木香

五
錢

甘草

炙四
錢

右對薑棗煎手足冷加白薑

休息痢乃脾胃虛冷

腸胃滑泄下痢無禁日夜無度

大養脾丸助胃膏

或益黃散不止理中丸不止三藥丸合和日乾夜吃

溫中湯 治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷

水洗浴以冷乳飲兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下痢

如水胃虛弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調

其胃氣下痢即止

乾薑

厚朴

各一分

當歸

桂心

甘草

各三分

人參

茯苓

白朮

桔梗

各二分

右㕮咀以水二升煮取九合六十日至一百日兒一服二合半餘隨兒大小加減

龍骨飲 治小兒五歲已下百日已上冷痢

龍骨

黃連

去鬚各一兩半

人參

甘草

炙

乾薑

炮

半夏

湯洗十遍焙乾

厚朴

去粗皮薑汁炙香熟

赤石脂

各一兩

右搗篩一歲每一錢水半盞入棗一枚同煎至三分
去滓分溫二服空心午後各一量兒大小加減

黃耆湯 治小兒下痢臭膿

黃耆 芍藥 乾薑 炮 人參 黃芩 去黑心 當歸 焙

甘草 炙各半兩 桂心 去粗皮一分

右搗篩一歲每一錢水半盞同煎至三分去滓分溫
二服空心日晚各一量兒大小加減

豆蔻丸 治小兒腸胃虛弱清濁不分痢下青白或如

凝脂陳寒痼冷或下黑瘀

肉豆蔻

去殼一枚

縮砂仁

去皮七枚

訶梨勒

去核三枚

鉛丹

炒胡

粉

各二錢

天仙子

一分與藥同和令勻入在糠斗子內合定用麻線縛定炭火內燒黑

存性細研

白礬

一分龍骨二錢

右為散再令勻每服半錢米飲調下乳食前服

艾葉散

一名艾香散

治小兒冷痢腹痛多時不斷

艾葉

炒

木香

黃連

去鬚各半兩

龍骨

研

訶梨勒

煨取皮

當歸

焙各三分

乾薑

炮製一分

右為散每服半錢米飲調下食前三四服量大小加減
人參飲 治小兒下痢白小便赤

人參

五分

龍骨

一斤

厚朴

去粗皮

薑汁炙

一兩

當歸

焙

乾薑

白

茯苓

去黑皮

甘草

各一兩

右搗篩一二歲每一錢水半盞煎至三分去滓分溫

二服空心日晚各一量兒大小加減

當歸飲 治小兒冷痢

當歸

焙

黃連

去鬚

赤石脂

乾薑

炮

龍骨

酸石榴

微
厚朴 去粗皮薑汁炙各三分

右搗篩每一錢水半盞煎至五分去滓分溫食前一

服量兒大小加減

丁香丸 治小兒冷痢心腹疼痛悶不欲乳食嘔逆不止

丁香 硫黃 胡椒 桂 去粗皮一枚 陳皮 去白焙 附子

炮製去皮
肉豆蔻 去殼一枚

右為細末用生薑汁煮麪糊丸如菉豆大每服五丸
生薑艾湯下乳食前服量兒大小加減

木香白朮散

一名木香散

治小兒冷痢腹痛四肢不和飲食

減少漸至羸瘦

訶梨勒

炮去核

厚朴

去粗皮薑汁炙

當歸

微炒各半兩

木香 乾

薑

炮

白朮

各一分

右為細散三歲小兒每服一錢水一小盞入棗二枚

同煎至五分去滓食前溫服量大小加減一方治白

痢腸胃虛弱腹痛不食加生薑二片煎

丁香散

一名香朴散

治小兒冷痢腹痛面無顏色四肢痿痺

不欲飲食

丁香

一分

厚朴

半兩去粗皮薑汁炙香熟

人參

去蘆頭

白朮

草豆

薏

去皮各半兩

當歸

一分微炒

白石脂

一兩

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小

加減一方有甘草用棗煎

白丸子

治小兒虛冷臟腑滑泄不止

硫黃

研

附子

炮製去皮臍各半兩

硝石

鍾乳

研

白龍骨

寒食麪

各一分

右研令勻細麪糊丸如麻子大每服三五丸粥飲下
量大小加減

玉脂散 冷痢大便色青甚有膿宜服

白石脂 當歸焙 丁香 白朮各一分 草豆蔻去厚皮

朴薑汁製各半兩

右為細末每服半錢以粥飲調下量兒大小加減

養臟湯 治白痢頻併

當歸焙 烏梅肉炒 乾薑 黃耆 白朮 龍骨各一

兩

右為細末每一錢水一小盞生薑粟米各少許煎至五分去滓溫服乳食前下量大小加減

固腸散 治冷痢腸滑下頻併

陳皮

一兩炒

白薑

炮

甘草

炙各二錢半

肉豆蔻

生二兩

木香

錢 嬰粟殼

去筋蒂蜜炙一兩

右為細末薑棗煎服

茯苓飲 治小兒冷痢白膿

白茯苓

去黑皮一兩一分

人參

一兩半

厚朴

去粗皮薑汁炙一兩半

桔

梗

炒

桂皮

炙各一兩

右搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服

食前日二服量兒增減

龍骨湯 治小兒冷痢腹痛不止

龍骨 甘草

黃連

去鬚各一兩

乾薑

炮

當歸

焙各三分

右搗篩一歲每半錢水一盞煎至三分去滓分溫二

服日再服量大小加減

厚朴九 治小兒脾胃虛弱清濁不分因成冷痢其色青

白甚則色黑

厚朴

去粗皮薑汁炙黃色

肉豆蔻

麩裏煨各一兩

木香

訶梨勒

三枚

麩裏煨

龍骨

半兩

用皮

右為細末水浸炊餅心和丸如麻子大一二歲每服

十丸溫米飲下日三服

厚朴湯 治小兒冷痢便青白或如凝脂或痢下瘀黑

厚朴

去粗皮薑汁炙

蒼朮

米泔浸焙

陳橘皮

去白焙各一兩

甘草

炙半兩

乾薑

炮二分

右搗篩每服一錢水一盞生薑二片棗二枚煎至五

分去滓溫服

補脾九 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑如凝脂

肉豆蔻

炮去殼一
枝為末

龍骨

燒研

乳香

研

蕪荑仁

炒研

麝香

研各

一錢

右為末同研勻軟飯丸如麻子大每服五七丸陳米

湯下

艾葉湯 治白痢

艾葉

微炒

當歸

各一兩

乾薑

木香

訶子

炮各半兩

右為細末每服一錢水八分粟米少許煎至五分去

滓食前溫服

乳香丸 治小兒冷痢諸藥無效

乳香

一分 訶梨勒

一兩煨用皮

地榆

半兩炙

赤石脂

半兩

乾薑

一分 炮裂

右為末粟米飲和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸

日三四服大小加減

草節丸 治小兒冷痢或下青白或下瘀黑或凝脂相
似

烏頭

炮去皮臍

黃連

去積

吳茱萸

湯泡焙炒

乾薑

焙各一錢

右為末作丸日服量大小加減

朴附丸 治小兒滑冷下痢不禁

厚朴

附子

乾薑

陳皮

各一兩

右為末糊丸粟米大每服三十九米飲下日三服

養脾丸 治便膿頻數

附子

一枚重半兩
炮製去皮臍

赤石脂

川薑

訶子

各一兩

右為細末粟米飲和丸如黍米大每服十粒食前粥

飲下

陳橘皮湯 治小兒冷痢心腹脹滿乾嘔不止

陳橘皮

去白焙

人參

各一分

甘草

炙半兩

右搗篩一歲每一錢水半盞生薑二片同煎至三分

去滓食前分溫二服日再服隨兒大小加減

訶梨勒丸 治小兒冷痢

訶梨勒

煨去核
半兩

桂

去粗皮
一分

赤石脂

半兩

右為末煉蜜和更入白中搗三百杵丸如麻子大二歲三丸三四歲五丸空心午後各一服米飲下

阿膠飲 治小兒白痢

阿膠

炙令燥一兩一分

黃芩

去黑心
一兩

黃連

去鬚
半兩

右剉末一二歲每服一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服空心日晚各一量兒大小增減

蜀椒丸 治小兒秋深冷痢止腹痛

蜀椒

去目及閉口者
炒汗出一兩

乾薑

炮製
一分

右為末煉蜜和丸如小豆大一歲兒空心麪湯下未
止日午再服量大小加減

木香丸 治小兒冷痢白膿臍下絞刺痛

木香

訶梨勒

煨去核
各一兩

右為末以粳米飯和為丸如麻子大一二歲三九五
歲五九米飲下食前服

醋石榴皮散 治小兒冷痢百藥無效

醋石榴皮

一兩剉碎
炒令微焦 硫黃一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

麝香丸 治小兒久患冷痢脾胃冷極致使大腸滑泄

不絕

麝香

一分
細研 鹿茸一兩去毛
塗酥炙黃

右為末煮棗肉合丸如菜豆大每服以粥飲下五丸

日三四服量兒大小加減

又方

當歸

半兩炒

大蒜

一顆

右為細末燒蒜熟和丸如菉豆大每服以粥飲下七
九日三四服量兒大小加減

治小兒冷痢方

用蓼菜搗汁量大小與之一方作芥菜

治冷痢內因脾胃虛冷外觸冒風啖食冷物積滯下痢

其證面青或白腸鳴腹脹乳食不化手足清冷下痢
青白或成白凍

右用不換金正氣散理中湯加茯苓厚朴入燒鹽下
感應丸或實脾散加白薑下五積丸或五積散加白
薑棗子粳米煎空心服

治患冷痢

用附子一枚炮水五升合煮鷄子一枚令熱以哺兒
瘥

治小兒冷痢多時宜服此方

用川椒三分去目及閉口者微炒去汗為末煉蜜和
丸如菉豆大每服以粥飲下五九日三四服量兒大

小加減

調胃散 治冷痢

人參

去蘆

陳皮

去白

白朮

蒼朮

白茯苓

去皮

桔梗

縮砂仁

厚朴

薑汁炒

肉豆蔻

扁豆

姜汁炒

薏苡仁

炒

山藥

石蓮肉

去心

粉草

以上各等分

右為末猪肉拌食痢不止加訶子肉吐不止加丁香
吐痢內虛可酌加附子木香重者加白薑

保嬰艾葉湯 治冷痢肚痛

陳艾葉炒 當歸各一兩 乾薑 木香 製厚朴 肉

豆蔻各半兩 草菓半兩 良薑 丁香各一錢 甘草五分

右為末粟米煎服

溫臟湯 治小兒因驚滯乳氣不宣導冷搏腸間下痢
青沫或乳多傷脾妳癖不化常服溫臟腑暖脾胃化

宿冷進乳食

人參

去蘆一兩

白附子

炮

陳皮

去白

白朮

各半兩

神麴

炒黃麥

藥

炒黃

甘草

炙丁香二兩

丁香

已上各

右為細末每服半錢空心棗湯調下

雄朱散方

治嬰孩小兒腸胃虛冷下痢頻併日夜痛

不可忍

雄黃

一分細研飛過

乳香

一錢細研

白礬

一錢燒

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下一

日三服

鷄子餅 療小兒秋夏冷痢腹脹乍熱白滯下方

用鷄子一枚胡粉一丸碎絹篩合鷄子黃共搗研調
勻熬令熟作鷄子餅兒一歲一食半餅日再不過二
餅即瘥兒大倍之凡羸弱冷痢用生薑汁蜜水各半
佐以木香豆蔻

普濟方卷三百九十六

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十七 明 周王朱橚 撰

嬰兒下痢門

熱痢 附論

夫小兒挾熱痢此由邪熱在於腸間因胃氣不和乳食傷動故食腹痛腸鳴下痢黃赤名熱痢者由本挾虛熱而又為風熱所乘風之與熱俱入於大腸而為熱痢也非是水穀之痢而色黃者為熱也

方

犀角丸 治小兒赤痢經時不止

犀角

鎊一兩一分

黃連

去鬚一兩半

女萎

一兩

白頭翁

去蘆頭一兩半

茜根

三分

枳殼

去瓢麤炒三分

甘草

炙半兩

赤石脂

一兩一分

黃芩

去黑心一兩

乾薑

半兩

桂皮

炙三分

龍骨

一兩

黃蘗

去粗皮炙半兩

右為細末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大一二歲

每服三丸三歲至六歲兒可四五丸空心午後各一

服米飲下

黃蘗湯 治小兒夏月傷暴寒寒折大熱入胃下赤白
滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩躁此太陽之氣外
傷寒使熱氣入胃服此方良若誤以痢藥下之或以
溫脾下之則熱劇以藥下之便數去赤汁如爛肉者
下之瘥宜以溫熱藥斷之下既不止倍增壯熱者服
之即效或是溫病熱盛復遇暴寒折之熱入腹下血
如魚腦者服之良方

黃蘗 黃連 升麻 白頭翁 白欬 當歸 牡蠣

一作白欬

散

石榴皮 黃芩 寄生 甘草 各二分 犀角 艾

葉 各一分

右咬咀以水三升煮一升二合百日兒至二百日一服三合二百至期歲一服三合半

赤石脂湯 治小兒卒下熱痢

赤石脂 兩 黃連 黃去 石膏 碎 甘草 炙 龍骨 知母 焙

前胡 赤茯苓 桂 去粗皮 芍藥 各一分

右搗篩一二歲每半錢入棗一枚水七分煎至四分

去滓溫分二服空心午後各一

栝蒌根散 治小兒熱痢體瘦口乾煩躁不欲飲食

栝蒌根 白茯苓 知母 黃芩 地榆 甘草

微炙

炙各半兩 人參 三分 黃蘗 半兩 赤石脂 一兩

去蘆

微炙

兩

右為麤散每服一錢水一盞煎至五分去滓不計時
量大小分減服之

龍骨湯 治少小壯熱渴引飲下痢

龍骨 甘草 大黃 赤石脂 栝蒌根 石膏

生
寒水石

桂心

各二兩

右製下篩以酒水各五合煮散二合二沸去滓量兒

大小服之

除熱結腸丸

斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肝

中瘡爛坐蟻生蟲

黃連

藥皮

苦參

鬼白

獨活

橘皮

芍

藥

阿膠

各半兩

右為末以藍汁及蜜丸如小豆大日服五丸至十九

如無藍汁可用藍子一合春蜜和丸亦不得傷飽傷
則再作

犀角散 治小兒熱痢煩悶腹痛面黃體瘦

犀角屑

半兩

赤芍藥

三分

黃連

三分

去

黃芩

半兩

知母

三分

歲莖

三分

地榆

半兩

甘草

半兩

炙

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量大
小日三四度分減服之

牡蠣丸 治小兒熱痢

牡蠣煨

黃連

去

黃蘗

去粗皮炙

龍骨

赤石脂

人參

去炙各
蘆甘草一兩

右為末煉蜜和搗千餘杵丸如麻子大一二歲每服

三九四歲至六歲五丸米飲下空心午後各一服

龍骨散 治小兒熱痢煩悶口乾多渴不欲乳食

龍骨

一兩

黃連

三分去

地榆

三分

黃芩

三分

烏梅肉

半兩

微炒

赤地利

三分

鼠尾花

三分

右為細散每服以粥米飲調下半錢日三四服量大

小加減

熊膽散

治小兒熱痢壯熱全不食乳食乳即吐

熊膽

半兩

黃連

去鬚三分

馬齒莧

乾者炒一兩

無食子

煨一枝

蚬

蛇膽

半兩

犀角

鎊一兩

右為細末一二百日兒每服一字新汲水調服空心

午後各一量大小加減

烏梅湯

治小兒熱痢壯熱多渴而痢不止

烏梅肉

二枚去核焙

黃連

去鬚

藍菜

各一兩

犀角

鎊

阿膠

炙燥

甘草

炙各半兩

右搗篩三歲每半錢水七分煎至四分去滓分溫二

服空心午後各一大小加減

麥門冬湯 療小兒夏月伏暑吐痢過後胃中虛熱渴

唯飲水

麥門冬

去心

甘草

炙各四分

枳實

炙

黃芩

人參

各三分

龍

骨

六分

右切以水二升煮取九合去滓溫服

黃連丹 治熱痢便血頻併

黃連

二兩
去鬚

當歸

一兩
焙

白頭翁

蔓菁菜

各三
分

木香

劉

川棟子

各半兩
麴裏煨

右為細末糯米飯丸如麻子大每服十粒米飲下量

大小加減

地榆散 治小兒痢腹痛心煩不欲飲食

地榆

三分
微炙

黃連

半兩
去鬚炒

赤石脂

一兩
人參

去蘆
頭

赤芍

藥

各半
兩

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁麴炒黃

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時量兒大小分減溫服

子苓散 治小兒熱痢腹痛壯熱心煩不欲飲食四肢瘦弱

子苓

一兩

知母

三分

女萎

三分

黃蘗

半兩

微炙

甘草

半兩

炙

赤芍

藥

半兩

右為粗散每服一錢水一小盞入竹葉七片煎至五分去滓不計時量大小分減服

黃芩知母湯 治小兒熱痢不止

黃芩

去心知母

焙各一兩

姜蕤

分三

黃蘗

去粗皮炙黃

甘草

炙各半兩

右搗篩一二歲每半錢水七分煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服一方加竹葉

梔子丸 治少小熱痢不止

梔子

七枚

大棗

四枚炙黑

黃蘗

分三

礬石

四分

黃連

五分

右為末蜜丸如小豆大每服五丸日三夜二服不止稍加至十丸

梔子仁散 治小兒熱痢腹痛心煩口乾小便赤黃不

欲飲食

梔子仁

當歸

微炒各半兩

黃蘗

三分微炙

地榆

三分微炙

黃連

一兩去鬚微炒

熊膽散 治小兒熱痢全不欲乳食身體壯熱

熊膽

一分蘆薈

三分黃連

半兩去鬚微炒

粟殼

一枚乾馬齒莧

一分

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

白頭翁湯 治小兒熱毒下痢如魚腦手足壯熱

黃連

去鬚
一兩

白頭翁

醋石榴皮

炙

犀角

銹屑各
半兩

右搗篩一二歲每半錢水七分煎至四分去滓分溫

二服空心午間晚各一服一方無犀角量大小加減

梔子丸 治小兒熱痢不止

梔子仁

七
枚

黃蘗

去粗皮
炙三分

白礬

熬枯
一兩

棗

大者三枚
燒令黑色

右為細末煉蜜和丸如麻子大三歲每服三九三四

歲每服五丸米飲下空心午後各一服

黃連湯 治小兒熱痢

黃連

去鬚
一兩

黃蘗

去粗皮
炙半兩

阿膠

半兩
炙燥

右除阿膠外搗篩每服半錢酒半盞入阿膠一片同煎至二分去滓空心日午近晚各一服

三物湯 治小兒久痢不食乳

大黃

生

甘草

炙

麥門冬

去心焙
各等分

右搗篩每三錢水一盞煎至五分去滓分溫三服空心下量兒大小加減

犀角散 治小兒熱痢不瘥

犀角屑

半兩

桂樹皮

一兩

黃連

半兩去
鬚微炒

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計
時量兒大小加減溫服

黃連湯 治小兒熱痢腹中疼痛或血痢

黃連

去鬚

山梔子仁

各三分

右搗篩三歲兒每半錢水七分煎至四分去滓分溫

二服空心午後各一服

訶梨勒散

一名訶
梔散

治小兒赤痢血痢腹痛煩渴

訶梨勒

煨去
核

梔子

去殼各
一兩

右為細末一二歲每服半錢米飲調下空心午後各

一服

黃蘗丸

治小兒熱痢下血

黃蘗

去皮
半兩

赤芍藥

四錢

右為細末飲和丸麻子大每服一二十丸食前米飲

送下大者加丸數

杏仁湯 療少小夏月伏暑吐痢過後胃中虛熱渴唯飲水

杏仁

五十枚
去皮尖

鹽

一合

右以苦酒一升煮取一半量與服之

治小兒熱痢方

煮木瓜汁飲之

又方

搗蒜傅兩足下

治熱痢備急方

用井水調臘茶蜜磨生薑渴則飲之

治熱痢方

小兒冒暑中熱積熱在臟或母觸冒熱毒乳兒內臟
腑積滯外因觸中暑熱之毒及內外因時行疫氣傳
染致成下痢或血痢治法以猪苓湯解除暑毒敗毒
散去風邪行滯氣四順飲蕩除熱毒平胃散補養脾
胃五積丸祛除積滯以四藥合用米湯煎調吞下五

積丸消積去熱其痢自止若患血痢則變白痢服以
溫脾之劑立可收功

治熱痢

用五苓散入車前子末米湯調吞服黃連阿膠丸或
用香薷湯倍加赤茯苓黃連酒水煎服或用久年白
鹽梅以蜜水各半并好茶煎服

治小兒熱痢不瘥

用蒲根一兩細切以粟米一合水一大盞同煮米熟

去滓取汁不計時量兒大小加減溫服

預知丸

傳氏活嬰方

治一切痢

方見前下痢門

黃白散

治小兒大小便出黃沫如蟹吐沫者良久即

青脾之虛熱也此方治之

大黃

白朮

各等分

右為末每服半錢水半鍾煎三分空心服

加味猪苓湯

治熱痢血痢

猪苓

去皮

赤茯苓

去皮

澤瀉

白朮

麥門冬

去心

百藥

煎黃連

去

大黃

煨

甘草

炙各等分

右咬咀水煎溫服血痢加阿膠蒲黃

赤白痢

附論

夫小兒痢下赤白由脾胃不和乳食所傷留滯腸中與津液相搏腸虛則泄故為痢也虛而有熱則赤虛而有寒則白冷熱不調則赤白相兼膿血雜下故名赤白痢方

藿香散 治冷熱不調赤白五色諸般瀉痢

陳皮

去白

厚朴

甘草

炙

枳殼

蒼朮

米泔浸

烏豆

炒去

皮

縮砂仁

白芍藥

當歸

藿香葉

川芎

木瓜

百藥煎

阿膠

炒等分

右為末白痢加白薑木香赤痢加黃連赤白痢加薑黃連用生薑茶芽蜜水煎調服血痢加訶子肉

治中桔梗丸

斷冷滯下赤白青色如魚腦脫肛出積

日腹痛經時不斷

赤石脂

五分

吳茱萸

乾薑

附子

當歸

厚朴

薑汁炒

白朮

木蘭皮

白頭翁

黃連

石榴皮

黃蘗

各三分

右為細末蜜丸如大豆大二歲每服五丸三歲已上服十丸十歲已上二十九丸暴下者服少許使瘥即下者盡一劑更合

龍骨散 治小兒赤痢白痢

龍骨

研

白石脂

研

胡粉

炒

白礬

枯過各

一兩

訶梨勒皮

二兩

黃連

去

陳橘皮

阿膠

炙

當歸

焙

人參

厚朴

去粗皮薑汁

炙各一兩半

右為散每服一錢空腹煮白粥飲調下日二服

赤石脂丸 治小兒赤白痢腹肚疴痛不思飲食

赤石脂

白礬

燒令汁盡

訶梨勒皮

白朮

黃耆

厚朴

去粗皮薑汁炙

醋石榴皮

乾木瓜

焙各半兩

肉豆蔻

去殼

一
枚乾薑

炮一分

右為末煉蜜丸如麻子大每服五丸溫米飲下空心

午後服量大小加減

溫中大黃湯 治小兒暴冷水穀下并洞泄注下或乳
冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白
下者良若已服諸痢湯去實胃中虛冷乾嘔眼下陷
煩擾不宜利者可除大黃若中乳冷乳母洗冷水氣未
消飲兒遂為霍亂者但用大黃小兒諸霍亂宜溫和
除之

大黃

六分

桂心

厚朴

去粗皮
薑汁炒

甘草

炙

乾薑

炮已上
各一分

人參

茯苓

去黑皮

白朮

當歸

焙已上
各二分

桔梗

三分
炒

梔子

二分

黃芩

澤瀉

各三分

右以水二升半煮取八合凡兒三十日至六十日一服二合七十一日至一百日一服二合半二百日已來

一服三合

白朮散 治小兒赤白痢腹內疴痛羸弱不能飲食

白朮

人參

去蘆頭各半兩

厚朴

三分去粗皮薑汁炙令香熟

黃連

去

當歸

二味各微炒

地榆

木香

桂樹皮

微炙

甘草

炙各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

量兒大小分減溫服

地榆散 治小兒赤白痢煩渴寒熱腹痛羸瘦不欲飲食

地榆

三分
微炒

醋石榴皮

半兩
微炒

龍骨

一兩
燒赤

當歸

半兩
微炒

黃

耆

半兩

阿膠

三分
搗碎炒

黃連

三分
去鬚
微炒

赤石脂

一兩
燒赤

烏

梅肉

半兩
微炒

右為細散每服以粥飲調下半錢不計時量兒大小加減服之

訶梨勒散 治小兒赤白痢腹脹疼痛不欲飲食四肢
瘦弱

訶梨勒

三分煨用皮

當歸

炒

黃芩

龍骨

地榆

炒

乾

薑

炮

陳皮

白朮

甘草

炙各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時
量大小加減溫服

小香連丸 治小兒瀉痢赤白脾胃虛弱糟粕不化腹
痛煩渴身熱并裏急後重

黃連

三兩乾薑

炮一分

當歸

一兩半

阿膠

炒為末醋煎成膏一兩半

右為末以膠膏為丸如小豆大三歲三十九米飲下
食前服一方醋糊丸大小加減

當歸丸

治小兒赤白痢不止腹痛

當歸

焙半兩

黃連

去鬚

龍骨

人參

各一分

無食子

炮二枚

鹿角

鎊

豉

炒各一分

右為末煉蜜丸如麻子大每服五十九溫米飲下空
心午後各一服量大小加減

訶梨勒丸 治小兒赤白痢裏急後重

訶梨勒

煨去核

地榆

炒

醋石榴皮

炙焦

高良薑

赤石

脂

各半兩

吳茱萸

湯洗炒一分

黃連

去鬚三分

右為末煉蜜為丸如麻子大每服七丸溫米飲下空心午後各一量兒大小加減

小兒暑月多吐瀉其證最宜詳審用藥不可差謬有伏暑吐瀉者小水必不利宜服五苓散香薷散有傷食吐瀉者其吐及糞皆有醋臭氣宜感應丸三方易

知今不復載瀉多日口唇齒俱白及瀉糞頗多者因
冷成也宜以六神散每二錢匕加附子末一錢煎三
四服防變痢也白者疳瀉宜官局六神丸瀉者不可
急以熱止之若止變成痢凡痛者皆因有積赤痢熱
積白痢冷積赤白痢冷熱不調積也赤多白少者熱
多冷少也白多赤少冷多熱少也

御米飲子 治赤白痢

罌粟殼

兩半

人參

兩一

厚朴

一兩

薑汁炒熟

白茯苓

兩半

乾

薑

一分
炮

烏梅

三箇連
核用

甘草

半兩
炙

訶子

半兩
去核

右為粗末每服五錢水一小盞半生薑三片棗一枚

同煎至一盞去滓溫服量兒大小分作服數若赤多

者加黑豆三十粒同煎

人參湯 治小兒赤白痢

人參

一兩
半

厚朴

去粗皮薑
汁炙一兩

白茯苓

去黑
皮

甘草

炙各
一兩

半
桔梗

各一兩
一分

桂皮

去粗皮
炙二兩

良薑

一兩

右搗篩每服一錢水半盞煎至三分去滓早晨午後

各一服量大小加減

麝香丸 治小兒赤白痢及水瀉

麝香

研半錢

巴豆

七枚去皮水半盞用蛤粉一匙同煮水盡去心細研

丹砂

研

硫黃

各一分研

草烏頭

炮一錢

砒霜

研半錢

右為末用棗肉為丸如黍米大每服一九水瀉併秋後痢蛤粉水下夏至後新汲水下赤白痢薑湯下更量大小加減

青皮丸 治赤白痢膿血相雜肚疼

青橘皮

去白焙

當歸 黃連

去鬚乾薑

炮各一兩

厚朴薑製肉

豆蔻

各半兩

右為細末麪糊和丸如黍米大每服十粒米飲下乳

食前大小加減一方化蒸餅為丸

朴附丹 治赤白痢相雜

厚朴

一兩薑汁炙熟

附子

一枚炮去皮

赤石脂

半兩

龍骨

半兩

訶梨

勒

一兩麪裏煨

烏梅肉

半兩炒

右為細末煉蜜合丸如黍米大每服十粒米飲下乳

食前空心服

訶梨勒丸 治小兒赤白痢瘦弱腹痛不欲飲食

訶梨勒

半兩煨用皮

黃連

三分去鬚微炒

地榆

微炒

赤石脂

當

歸

微炒半兩

吳茱萸

一分湯浸五次炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時以粥飲下五九
量兒大小加減

鹿角丸 治小兒赤白痢腹痛不欲乳食

鹿角屑

蕪荑仁

附子

炮製去皮各一分

赤石脂

黃

連

去鬚微炒
各半兩

當歸

微炒
一分

右為末煉蜜丸如菉豆大不計時以粥飲下五九量

兒大小加減

白朮湯 治小兒赤白痢日夜三五十行

白朮

一兩一分

乾薑

炮一分

白茯苓

去黑皮

甘草

炙一分

附子

炮去皮

各半兩

右搗篩每一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服空

心食前服量兒大小加減

犀角湯 治小兒赤白痢日夜數十行腹痛後重

犀角

鎊

苦參

黃連

去

地榆

黃蘗

去皮炙

天花

粉一分

右搗篩每一錢水半盞煎至三分去滓分溫二服空

心午後各一服量大小加減

木香黃連散 治小兒赤白痢腹內疼痛煩渴

木香

黃連

去鬚各

訶藜勒

煨去核

肉豆蔻

去皮

二枚

右用為散每服半錢米飲調下

右用為散每服半錢米飲調下

中黃散 治小兒下痢赤白乳食減少腹痛滿悶

定粉

鉛丹

同炒赤

龍骨

各一分

訶梨勒

炮二錢

右為散每服半錢紫蘇木瓜湯調下量大小加減

豆蔻香連丸 治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣

客於下焦腸胃疴痛日夜頻併不食並皆治之

木香

半兩

黃連

三分去鬚炒

肉豆蔻

二枚

丁香

一分

訶梨勒

半兩

煨

右為細末粟米粥和丸如黍米大三歲每服十九乳

前服米飲下量大小加減一方無丁香加阿膠

地榆散 治冷熱痢腹痛下痢赤白頻併

地榆 烏梅 柏皮 甘草 當歸

右為末等分清水煎去滓服極效

罌粟飲 治赤白痢

丁香^{錢五} 黃連^{去鬚} 粟殼^{去蒂萼} 甘草^{一兩} 殭蠶^{半兩炒}

沉香^{錢三}

右用生薑二兩切同炒為末每服一錢米飲下赤痢

生地黄七寸白痢烏梅一錢並煎湯調下如有熱小
柴胡湯解之

小駐車丸 治冷熱不調赤白五色諸般痢

黃連

一兩去鬚
同白薑炒

白薑

一兩同
黃連炒

阿膠

麩炒

神麴

炒

當歸

各一
兩

右為末醋糊丸赤痢黃連甘草湯下白痢甘草湯下
地榆散 治小兒赤白痢不止

地榆

三分

醋石榴皮

半兩炒

白龍骨

赤石脂

各一兩

黃

連

三分炒

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫服
不計時量大小分減

鹿角九 治小兒下痢赤白

鹿角

鎊

蕪荑仁

炒

附子

炮去皮
各一分

赤石脂

半兩

右為末煉蜜和丸如麻子每服五丸溫米飲下空心
日晚各一量大小加減

藍葉湯 治小兒赤白痢挾熱多渴宜服

藍葉分黃連

去鬚 一兩

白茯苓

半兩

冬瓜子

炒 半兩

右搗篩每一錢入蜜少許水一小盞煎至五分去滓

分溫二服空心午後各一量大小加減

黃連湯 治小兒赤白痢腹痛

黃連

去鬚 一兩

乾薑

炮

艾葉

各半兩

烏梅肉

三枚

右咬咀每服二錢以水一大盞煎去滓取三分空腹

溫服

地榆飲 治冷熱痢腹痛赤白頻併

地榆

分一

甘草

分二

芍藥

錢一

當歸

錢一

錢

右為飲子每服一錢水一中盞煎至五分去滓服

地榆黃連散 治小兒赤白痢不欲飲食四肢瘦弱

地榆

炒

當歸

三分

黃連

去鬚

木香

各半

兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時

量大小分減

鹿茸散 治小兒赤白痢

鹿茸

去毛

甘草

炙

訶梨勒

煨各

半兩

右為散每服半錢米飲調下食前日三服量大小加減

神捷散 治小兒赤白痢

大棗

四枝

梔子仁

五枝

乾薑

半栗子大

右並燒黑色為散每服半錢米飲調下三四服量大

小加減

白附香連丸

治小兒胃氣虛暴傷乳哺冷熱相雜瀉

痢赤白裏急後重腹痛掙撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香

各一分

白附子

光二箇

右為細末粟米飲丸如菴豆大或黍米大每服十九至三十丸食前清米飲下日夜各四五服

澀腸丸

治小兒下痢赤白後重頻併

龍骨

海螵蛸

訶子

炮去核各等分

右為細末白糊丸如小豆大每服三十丸米湯送下

黃連阿膠丸

一名香連丸

治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白

狀如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴大便秘不利

心躁不思乳食

黃連

去鬚
三兩

茯苓

去粗皮
二兩

阿膠

炒一兩
另為末

右黃連茯苓同為末水調阿膠和藥為丸如黃米大
每服二十九乳食前溫米飲下一方加肉豆蔻訶子
各一兩名小黃連阿膠丸一方用生薑切拌黃連炒
去薑為末陳倉米飯丸治痢下純赤一方糊丸治膿
血相雜腹中疼痛不思乳食

薑連散 治冷熱不調赤白五色諸般瀉痢

生薑

四兩黃連

一兩去鬚薑
炒分作二分

甘草

炙五分

右同為細末以黃連甘草治熱痢血痢生薑甘草治
白痢米湯下

必效鷄子餅 療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久
不瘥

鷄子

二枚
去白

胡粉

二錢
炒

蠟

一棗
許

右為末於鍋中熬令消下鷄子胡粉候成餅平明空
心與服可止痢

紅倩丹 治赤白痢久下不瘥

赤石脂 乾薑 肉豆蔻

各一兩

右為細末白麴糊和丸如黍米大每服十粒食前米飲下

三骨散 治小兒赤白痢

狗頭骨 羊骨 鹿骨

各一兩

右并燒灰細研每服以粥飲調下半錢不計時量大小加減

黃連蕪荑丸 治小兒赤白痢

黃丹

黃連

去鬚

白蕪荑

各一兩

右為末以棗肉和為一塊用炭煨令烟盡候冷細研以軟飯和丸如菜豆大每服以水下五九日三四服量大小加減

百粒丸 治小兒赤白痢

川黃連

厚朴

吳茱萸

各一兩生薑一兩打碎同淹一宿炒香

右為細末麪糊丸如梧子大陳倉米飲下二九如黍

米大粟飲下十粒瀉甚者加肉豆蔻一箇沒石子二箇

黃連散 治小兒赤白痢

黃連

去鬚檳榔 剉各等分

右為細末如患赤痢黃連末二錢檳榔末一錢同一處和勻每服半錢米飲調下大小加減白痢黃連末一錢檳榔末二錢

治小兒赤白滯下方

薤白

一把 二升

右以水三升煮取二升分三服一方以水五升煮取三沸百日兒每服三合

又方

亂髮灰

鹿角灰

各一分

右等分三歲兒以水和服三錢日三服

治小兒赤白痢方

白蘘荷根汁

生地黃汁

各五分

右微火上煎一沸服之一方單用生地黃汁服之

桂連丸 治小兒下痢赤白腹痛不可食

桂心 黃連

各等分

右為細末白糊丸如小豆大每服三十九米湯送下

桃花丸 治小兒赤白痢腹痛不食

赤石脂 川乾薑

炮等分

右為細末白糊丸如小豆大三歲三十九米湯下

茱萸丸 治冷熱不調赤白五色諸般痢腹痛後重

吳茱萸

黃連

一兩
去鬚

右同炒香熟各分為二加甘草同為末各以酸醋丸
赤白痢二藥俱用赤痢多用黃連白痢用茱萸並米
湯下一方治赤白膿血相雜腹痛後重用甘草糊丸
三歲三十丸如小豆大

黃蘗丸 療小兒赤白痢腹痛

黃蘗

半兩
炙

當歸

六分

右切以水一升煮取六合溫服之佳一方為末煨大

蒜和九如菜豆大以粥飲下七九日三四服大小加

減

又方

葭蓉子

羊肉

薄切
等分

右以綿裏內下部中不過再瘥

治小兒赤白痢

黃連

一兩去
鬚微炒

葭蓉子

一分水調炒
乾黃黑色

右為細末用麪糊和九如菜豆大每服粥飲下五九

日三四服大小加減

又方

自死牛膽

一
枝

胡椒

五十
粒

乾薑

一
錢

右將胡椒內入牛膽中寅日於堂屋後東第七椽懸之至四十九日取為末用麪糊和丸如菜豆大每服粥飲下五九日三四服大小加減

又方

川烏頭

一兩炮
製去皮

香墨

半
挺

右為細末用醋麪糊為丸如麻子大每服以溫米飲下二九日三四服大小加減

治小兒赤白痢方

用糝麻子一兩炒為散蜜水調下半錢食前加減一方為丸蜜水化下二九

治小兒赤白滯下

搗石榴皮汁服之一方酸石榴燒灰末服半錢治水瀉洞注下痢粥飲下

又方

燒蜂房灰水和服之一方以露蜂房燒灰用乳汁調

下半錢治血痢

罌粟膏治小兒赤白痢不思食下痢頻併

罌粟殼

不拘多少
瓦上炒黃

右用醋為末蜜丸如鷄頭大三歲一九米湯化下

經紅散 治小兒下痢赤白腹痛不食

用荔枝殼炒為末三歲半錢米湯下

又方

用松樹皮為末米湯調下

治赤白痢久不瘥困重大人亦療之

用麻子炒香熟為末三歲半錢蜜漿調下 凡下痢
日久急治下部不曉此者俱攻其上不以為意下部
生蟲食其肉爛兒五臟便死燒艾於管中薰下部令
煙火入少許雄黃尤妙

治赤白痢赤者熱也白者冷也冷熱不調成赤白痢

右以生薑切片與好茶等分以蜜水各半煎服薑能助陽茶能助陰平調陰陽解毒散

治小兒赤白痢及水痢

用雲母粉半兩研作粉煮白粥調空心服之

治小兒赤痢

取鷄腸草汁一合和蜜服之良

治小兒赤白痢渴飲水又嘔逆方

用楮實炙構葉令香黃以飲漿半斗浸構葉使水綠

色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮三二沸去
木瓜使煖細細服

治患赤白痢

用山豆根搗末蜜丸空心煎水下二十九二服自止
治小兒三歲痢或赤白冷熱不調

用鷄子一枚破其頭如粟米大出黃白於甌中和胡
粉如皂角子大更調入殼內胡粉蒸令熟以饅兒取
瘥止一方鷄子白定粉相和研膏用水七分煎三分

溫服量兒大小加減治疳痢兼渴不止一方以定粉
鷄子清和為餅子炙黃焦為散粥飲調下半錢日三
四服

治小兒洞下并赤白痢

用牛角中骨燒末飲服方寸匕一方用牛角鰓灰水
和服三寸匕粥飲下半錢亦可量大小加減

黃連湯 治小兒赤白痢多時體弱不堪

用宣連濃煎和蜜服日六七服量大小每煎三分水

減二分頻服一方用黃連一兩去鬚麤搗水水煎服
治洞泄不止

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蜚蟲在下部也

麝香 礬石 巴豆 附子 珍珠 雄黃

各等分

右製合取桑條如箭幹長二寸以綿纏頭二寸唾濡
綿沾取藥着綿上內穀道中半日復易之日再用神
效

治小兒赤白痢

用生地黃汁一合服之效

八味丸 治赤白痢

枳殼

半兩

杏仁

一百二十粒去皮尖

鹽梅

七箇

巴豆

二十粒去油

好茶

末

四錢

黃連

一兩

黃蠟

五錢

百草霜

二兩

蓮蓬

一兩

右為細末溶黃蠟為丸赤白甘草湯下白痢白薑湯

送下

六神丸 治赤白痢

黃連

二兩

木香

麥芽

炒

枳實

麩炒

赤茯苓

各一兩

麝香

錢 礬石 巴豆 附子 珍珠 雄黃

各等分

右製合取桑條如箭籥長三寸以綿纏頭二寸唾濡
綿展取藥着綿上內穀道中半日復易之日再用神
效

六神丸 治赤白痢

黃連 木香 麥芽 枳實 茯苓

炒 各一兩

右為細末入神麴一兩五錢打糊丸如粟米大每服
五七十丸薑湯下

靈妙散 治小兒冷熱不調腹疼泄瀉下痢無度嗜卧
不食

人參二兩甘草一錢罌粟殼三兩切碎炒焦黑用

右件為細末每服一錢泄瀉煎薑湯調下赤白痢煎
生薑烏梅湯調下白多赤少用溫酒白湯各一半調
下赤多白少糖湯調下乳食前服忌生冷之物

沉香斷紅丸 治小兒下痢赤多白少或純便血如豆
汁

沉香

半兩

當歸

酒浸焙乾

川芎

芍藥

地黃

阿膠

切碎

炒

續斷

六味各一兩

右為細末煮麪糊為丸如黍米大每服三十九溫酒

飲下乳食前服

梅連丸 治小兒下痢赤白裏急後重不思飲食

烏梅肉

黃連

黃蘗

艾葉

炒

乾薑

各等分

右為細末煮麪糊為丸如黍米大每服三十九溫米

飲送下乳食前服

治小兒赤白痢

以腐乳細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸服之

治小兒及大人赤白痢

以新鮮皮一觔去黑皮細切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立愈

治小兒赤白痢及飲水嘔逆

用炙構葉令香黃以飲漿半升浸構葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煮二三十沸去木

瓜使煖細細服

久赤白痢

附論

夫小兒久赤白痢者由冷熱不調熱乘於血血滲腸間與冷氣津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連綿久不瘥也

方

黃連散 治小兒久赤白痢不止腹痛虛羸弱不欲飲食

黃連

一兩去鬚

厚朴

去皮薑汁炙

乾薑

炮

木香

半兩

當歸

黃

牛角腮

燒灰各三分

艾葉

半兩炒

龍骨

半兩

烏梅肉

一分炒

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小

加減

丁香散 治小兒久赤白痢漸至羸弱胃氣全虛不欲

飲食

丁香

厚朴

去皮薑汁炙各半兩

木香

一分

黃連

去鬚炒

當歸

炒

訶梨勒

煨用皮

白朮

炒各半兩

赤石脂

一分

伏龍肝

半兩

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小

加減

肉豆蔻散 治小兒久赤白痢腹內疴痛全不思食漸

至羸困

肉豆蔻

三枚 去皮

青橘皮

焙

當歸

微炒

地榆

黃牛角鯁

炒厚朴

去皮薑汁炙香

乾薑

一分 炮

黃連

炒各半兩

右為細散每服以粥飲調下半錢日三四服量大小

加減

斷下湯 止赤白久痢不禁

茯苓

白朮

各一錢

甘草

半錢

草薢

三箇

木香

半錢

大罌粟

殼

十四箇去筋醋炒

右對棗子烏梅用瓦器煎服

鹿角蕪荑丸 治久赤白痢不止腹痛

鹿角屑

一分

蕪荑仁

炒

附子

炮裂去皮

黃連

去鬚炒

地榆

各一分

赤石脂

分兩

右為末煉蜜和丸如菜豆大每服以粥飲下五九日

三四服量大小加減

木香散 治小兒久赤白痢腹脇疼痛

木香

訶梨勒

煨用皮

臭樗樹皮

炙焦

木賊

黃連

去鬚

炒各半兩

右為細末每服以粥飲調下半錢日三四服量兒大

小加減

硃砂丸 治小兒久赤白痢肌體羸瘦四肢煩熱

硃砂

半兩研飛

巴豆

七枚去皮心研紙裹去油

麝香

一錢雄黃

硃黃

各一分

右為末都研勻湯浸蒸餅為丸如黍米大每服以新汲水下二九日三服量大小加減

龍骨丸 治小兒久患赤白痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連

去鬚炒

黃蘗

白龍骨

訶梨勒皮

炮

木香

各一

分

當歸

炒

乾薑

白礬

研各半兩

胡粉

炒黃三分

右為末煉蜜丸如菉豆大三歲每服十九溫米飲下

日三服量大小加減

妙應膏

一名黃丹丸

治久痢赤白諸藥未效

蜜陀僧

末

黃丹

研

定粉

研各半兩已上研細用醋淬鉄銚內炒茶褐色

訶

子肉

木香

各一兩搗為細末

真砒霜

錢一

巴豆

十粒去皮心膜出油

麝香

錢一

右都研勻細用黃蠟四兩慢火鎔同諸藥熬成膏如黍米大每服末週歲小兒一粒二三歲四五歲三粒六七歲五粒十歲以上七粒若血多甘草湯放冷下

膿多艾葉湯下臨卧服一方無木香用生薑自然汁
濃研香墨浸蒸餅和丸以冷甘草湯下量大小加減

麴蘖丸 治赤白痢久不瘥

神麴

二兩
半炒

麥蘖

三兩
半炒

黃連

肉桂

各二兩

茱萸 當

歸

附子

一兩

川椒

三分

烏梅

二兩

右為末粟米糊丸每服四五十九米飲下小兒量與

金鑠散方 治小兒久患赤白痢不瘥

官桂

半兩去粗
皮薑汁炙

黃連

一分用茱萸同炒
去茱萸只用黃連

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯下
一日三服

曩痢

附論

夫小兒曩痢者由秋夏晨朝多中暴冷之氣冷氣折其
四肢則熱不泄熱氣入腹則變為痢作白小腹脹痛肌
體壯熱其脉洪大急數皆由冷熱氣相并連滯不瘥故
為曩痢也

方

黃連丸 治小兒曩痢紅久不斷增減有時

黃連

去鬚炒

甘草

炒

人參

去蘆頭

赤石脂

各半兩

烏梅肉

一分炒

龍骨

厚朴

去皮薑汁炙

枳殼

麩炒黃

黃芩

白茯苓

苓

各半兩

右為細末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下七九日三四服大小加減

肉豆蔻散 治小兒曩痢不止腹痛

肉豆蔻

去殼

乾薑

炮

厚朴

去皮薑汁炙

硃砂

細研

龍骨 訶

梨勒

煨用皮

木香

枳殼

楚炒黃各一分

右為細末每服以溫漿水調下半錢日三四服量大

小加減

治小兒羸痢方

甘草

炙

茯苓

各六分

人參

黃連

各四分

厚朴

炙

生薑

各一分

龍骨

八分

右以水一升煎取三合欲卧先取鹽麩麝香為小丸
內下部中然後服此米飲分服甚妙忌如常法

溫臟湯 治小兒曩痢不止手足逆冷

肉豆蔻

一兩 去皮

乾薑

一兩 炮

厚朴

去皮薑汁炒

龍骨

當歸

各半

附子

一枚重半兩 炮去皮

木香

半分

右為細末每服一錢水八分入薑三片煎五分去滓

放溫乳食前服

通玄丹

一名麝香丸

治小兒曩痢久不瘥腹多膨脹痢如棗

花

血痢

夫熱痢不瘥則變血痢由痢久腸虛熱毒留滯血脉妄行流滲腸間腸虛則泄故為血痢也

方

千金枳殼湯 治血痢

枳殼

炒

甘草

黃連

去

木賊

當歸

阿膠 槐

花 荊芥穗

山梔仁

炒

大黃

各等分

右為細末白鹽梅好茶蜜丸食前服

胡黃連散 治小兒血痢不止

胡黃連

黃連

去鬚

丁香

蘆薈

五靈脂

乾薑

炮

檳榔

各一分

木香

麝香

各一錢研

右為細末用軟飯丸如麻子大每服三五丸米飲下

量大小加減

黃芩丸

治小兒血痢腹痛減食四肢瘦弱渴不止

黃芩

去黑心

地榆

龍骨

人參

白朮

厚朴

去皮

薑汁炙

石榴皮

切白茯苓

去皮

漏蘆

去蘆頭

各一兩

右為細末煉蜜和丸如菜豆大每服七丸空腹米飲

下日二服量兒大小加減

黃連散 治小兒血痢煩熱口乾腹痛

黃連

一兩
去鬚

犀角屑

白蘘荷

黃芩

蔓菁菜

吳藍

各一兩

白頭翁

三分

甘草

半兩
炙

茯苓

半兩

右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計

時量兒大小加減服之

藍葉湯 治血痢不斷

藍葉

一兩

地龍

人參

烏梅

冬瓜子

蝸牛殼

炒
赤茯苓

黃連 各半兩

右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓乳食前溫服

茜根飲 治小兒血痢不止肌體黃瘦腹痛不能飲食

茜根

一兩三分
地榆 炒

馬蘭子

炒一分

黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮炙

黃芩

去心各一兩半

當歸

焙一兩

右搗篩一二歲每一錢水七分入生薑二片同煎至四分去滓分溫二服空心晚食前各一服更隨兒大

小加減一方無生薑

茜根湯 治血痢不瘥

茜根 地榆 黃連去 赤石脂 阿膠各一兩 甘草

炙黃蘗各半兩

右為細末每服一錢水八分煎至五分去滓溫服

黃連湯 治小兒血痢無度

黃連去 甘草各半兩 黃蘗子 吳藍葉 犀角屑各一

分
梔子仁二枚

右搗篩一二歲每服一錢水七分煎至三分去滓分
二服食前服量兒大小加減

地榆湯 治小兒血痢并蠱毒痢

地榆

去皮炒

黃連

去鬚

黃芩

去黑心各一兩半

馬蘭子

炒半兩

茜

根一兩

右粗搗篩一二歲每一錢水半盞入生薑一片同煎
至三分去滓分溫二服食前日二服更隨兒大小加
減一方加蔓菁根無茜根

厚腸丸 治血痢脫肛腸虛

黃連

一兩炒

川楝子

木香

半兩炮

膠珠

當歸

各半兩

吳茱萸

半兩同黃連一處炒

右為細末粟米飯為丸食前米飲送下一歲十九以

意加減

檳榔湯 治小兒瀉血不定

檳榔白皮

分三

無食子

肉豆蔻

去殼一兩

茜根

半兩茶

末

分一

右咬咀每一錢水七分煎至四分去滓分溫二服早
晨晚後各一量大小加減

蝟皮散 治小兒臟毒瀉血

刺蝟皮 陳槐花 白礬 鹿角屑

各一兩

王瓜

半兩

右同入沙盒子內鹽泥固濟令乾燒令通赤取出為
細散每服半錢入生薑自然汁兩三點用臘茶調下
治血痢神效妙方

罌粟殼

連蓋分作四片去穢用
雄黃猪膽塗炙半兩

人參

牡丹花心

三月取
了晒乾
木香
麩炒各
陳米
錢二

右為細末蜜湯調下嘔吐不食甘草橘皮湯調下不

過三服效

柏枝飲治小兒血痢進退不定

柏枝 地榆 白頭翁 罌粟殼 甘草
各等分

右為末三歲一錢水半盞烏梅一箇煎三分去滓食

前服

沒石子丸 治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹

痛後重晝夜不止遍數頻多

沒石子

地榆

各等分

黃蘗

蜜炒一兩

黃連

一兩半

酸石榴

皮

一兩

右為細末以煮醋麪糊和丸如麻子大每服十九至二十丸溫米飲下食前服

黃連湯

黃連

去鬚一兩半

艾葉

炒一分

阿膠

炙令燥半兩

豉

十粒炒令黃焦

右搗篩一二歲每一錢水七分入葱白二寸并鬚切

同煎至四分去滓分溫二服空心午後各一量兒大
小加減

薤白飲 治小兒血痢并熱毒蠱毒

薤白

十莖切一方用葱白

香豉

一合半

山梔子仁

五枚

黃連

去鬚半兩

右除香豉薤白外餘粗搗篩一二歲每一錢水七分
入香豉二七粒薤白一莖切同煎至三分去滓分溫
二服量兒大小加減

固腸丸 治小兒臟腑虛瀉血痛

槐蛾

半兩炒黃色

肉豆蔻

三枚麩裏煨香

乾薑

炮裂半兩

枯礬

一分

右為細末麩糊和丸如麻子大乳香湯下一二歲每

服十九日進二服

地榆丸 治小兒腸虛腹脹瀉血不止

地榆

一兩

草豆蔻

三枚炮去皮

黃耆

一兩

枳殼

麩炒半兩

右為細末麩糊為丸如麻子大每服十九甘草湯下

日三服

四生散 治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮血

罌粟

去莖蒂筋
半生炙

黑豆

一合生
半炙

甘草

生半
炙

生薑

半生
炙

各一
兩

右剉散每服二錢溫服如嘔食不入加人參少許

必效丹 治血痢頻併

川黃連

二兩

大棗

半升

乾薑

一兩

白礬

半兩

右用瓦器盛鹽泥固濟留一竅子以木炭火燒烟息
為度取出搗羅為細末白麯糊丸如黍米大每服十
粒米飲下量兒大小加減

地榆散 治小兒血痢

地榆

一兩半
炒黑

黃蘗

一兩半
去粗皮炙

馬蘭子

半兩
炒

茜根

一兩

右為粗散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
不計時量兒大小分減服之

麝香散

一名鹿
角散

治小兒血痢不止

麝香

一錢

鹿角屑

半兩
炒焦

亂髮灰

半兩

右研為散每服半錢粥飲調下日三四服量大小加

減

治血痢脫肛

罌粟殼

大者七箇
半炙半生

大甘草

二寸切兩片
半炙半生

烏梅肉

槌碎

右用水一大碗

生薑十片薤白二十根煎至一半去

滓婦人產前產後者皆可分作二服十歲以下分為五六服大小加減服後惡心如醉一霎時神驗仍忌生冷魚鱗油膩之物

地榆散

治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮血

地榆

訶子

甘草

各等分

右為末每服一錢鹽米湯調空腹服

黃芩湯 治小兒血痢不止肌體黃瘦腹痛不能飲食

黃芩

三分

艾葉

半兩炒

當歸

三分炒

右為粗散每服一錢水一小盞入薤白三寸豉五十粒煎至三分去滓不計時量兒大小分減溫服

犀角散 治小兒血痢并蝨毒痢

犀角

鎊末半兩

桂皮

去粗皮炙四兩

右搗篩一二歲每一錢水七分煎至四分去滓分溫

二服空心午後各一量兒大小加減

青橘丸 治小兒熱痢不瘥血脉妄行變成血痢

青橘皮

去白焙

黃連

去鬚等分

右為末用豬膽汁和藥入膽內以米泔煮熟取出入麝香少許研勻丸如黍米大每服十五丸米飲下

雙粉丸

治小兒血痢身熱不食

輕粉

五分

定粉

三錢

右為末蒸餅為丸如小豆大三歲三十九煎艾湯下

治血痢

用鹽梅除核一枚臘茶研煎醋湯溫服

又方

用蘿蔔切碎取清汁一盞蜜水各半煎服無蘿蔔以
子代亦可日哺米飲下

備急方

用向東日晒久年壁土炒車前子揀淨用米煎服

治小兒血痢

取生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙空心飲之一方搗汁飲之

治小兒血痢煩躁并治蠱毒痢

取藍青汁量大小增減服之

療小兒下鮮血

取梔子仁燒灰末水和一錢服之量大小加減

治小兒血痢腹肚疴痛方

用益母草半兩以水一盞煎至五分去滓不計時量

兒大小分減溫服

三物湯 治血痢

胡黃連 烏梅肉 竈下土

右等分為末食前茶清調服

苦參散 治血痢

好肥白棗 山梔子 各二分 苦參 一分

右三味用箬葉包再用紙裹以鹽水洗淨黃泥固濟
用火煨令通赤取出地上過一宿為細末陳米飲下

治氣痢血痢頻頻欲行不行

黃耆 甘草

炙

木通

車前子

炒

淨陳皮

淨青

皮

炒

製厚朴

罌粟殼

醋炒
等分

右以水煎空心服痛加赤芍藥白芍藥製枳殼烏梅

膿血痢

夫小兒膿血痢者由腸胃虛弱冷熱不調寒多則色白或如凝脂與膿兼下熱多則色赤或似梔子汁甚則純下鮮血冷熱交攻膿血雜下治法當分其冷熱疳蠱而

治之則無不瘥

方

療小兒膿痢直從春夏至秋冬以來不瘥者

薤白

切一合

生薑

蕪荑

各一分

子芩

黃蘗

當歸

各二分

香豉

一合綿裹

右切以煮銀水重瀝一升半煮取九合分服以瘥為度秋末冬末加赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

黃連湯 治小兒膿血滯痢并冷痢腹痛

當歸

切一兩

黃連

去鬚三分

桂

去粗皮三分

赤石脂

一兩一分

人參

三分 乾薑

白頭翁

甘草

各三分

龍骨

附子

各一兩炮

右剉如麻豆大每一錢水七分煎至四分去滓分二服空心午後各一量大小加減冷去白頭翁加牡蠣

三分

羚羊角湯 治小兒熱痢下血并體熱心煩口乾不欲飲食四肢羸瘦

羚羊角

屑

茜根

吳藍

各三分

黃連

去鬚

赤石脂

地

榆

當歸

炒

阿膠

炙一兩

黃芩

去心

甘草

半兩

右搗篩每服二錢水一盞煎至五分去滓溫分三服

人參散 治小兒膿血痢久不瘥腹痛不欲飲食

人參

去蘆

當歸

炒

地榆

阿膠

炒

黃連

炒

子芩

黃

藥

炒

赤芍藥

蕪荑

炒

厚朴

去粗皮薑汁炙各半兩

右為散每服一錢水一盞入薤白一莖豉五十粒煎至五分去滓不計時量大小加減

赤石脂散 治小兒下痢膿血腸鳴腹痛亦治赤白痢

赤石脂 研 龍骨 研 地榆 黃連 去鬚各一兩 人參 三分 厚

朴 去皮薑汁塗五遍炙 當歸 焙 乾薑 炮製各半兩

右為散每服半錢米飲調下日三服或煉蜜丸如梧子大乳汁下五丸至七丸空心午後各一量大小加

減

肉豆蔻散 治小兒膿血痢

肉豆蔻 二枚去殼 當歸 焙 蜜陀僧 研 訶梨勒 去核 黃連 去鬚

枳殼

麩炒各一分

龍骨

半兩 乾薑

炮半兩

右為散每服半錢空心米飲調下隨兒大小加減

沉香豆蔻丸 治小兒乳哺失宜冷熱不調熱衝上膈

冷歸下焦致虛實不等水穀不化遂傷泄痢夾積則

變為下痢膿血

當歸

木香

白朮

各一兩

沉香

白芍藥

人參

去蘆頭

蓬莪茂

縮砂仁

各一錢半

右為細末麪糊丸如黍米大每服十九二十丸米飲

下量大小加減

黃連丸 治小兒膿血痢并赤白痢

黃連

去鬚

龍骨

研

黃芩

去心

白石脂

研

當歸

焙

赤石脂

研各三分

烏梅肉

炒半兩

右為末研令勻煉蜜丸如麻子大每服五丸空心晚食前各一服米飲下量大小加減

鮮湯丸

治小兒瀉痢五色膿血如爛魚腸並無大便

只是膿血腸中攪痛

粉霜 輕粉 硃砂 硃砂各一錢 白丁香四錢 乳香

半錢 巴豆七粒去皮心不去油

右為細末蒸棗肉丸如小豆大三歲二九煎鮓湯吞下候積下與調胃氣食前服

建胃丹 治泄痢並膿血日漸羸瘦

黃連一兩炒 龍骨 白石脂 神麴炒 烏梅肉炒 乾

薑各半兩 白礬二錢

右為細末醋煮麴糊和丸如黍米大每服十粒米飲

下量兒大小加減

乾薑散 治小兒下痢膿血腹痛腸鳴

乾薑

炮製一分

黃連

去鬚三分

人參

三分

肉豆蔻

去殼一枚

當歸

焙三

分

厚朴

去皮薑汁塗五遍炙五錢

右為細末每服半錢以粥飲調下空心午後各一量

大小加減

肉豆蔻丸 治小兒下痢膿血腹痛虛煩

肉豆蔻

去殼

訶梨勒

炮去核各三錢

蜜陀僧

錢一人參

白茯苓

苓 去皮各一分

右為細末用燒粟米飯為丸如菉豆大每服七丸溫

米飲下

蠟茶丸 治小兒下痢膿血寒熱不除

豉

八十粒炒黃

大豆

半兩炒黃香去皮

黃連

去鬚硝石各一分

芫花

醋炒焦

巴豆

二十粒去皮麤炒令香出油用

右為細末入鎔蠟一分并煉蜜和丸如黍米大一二

百日內每服二九一二歲每服可五九三四歲每服

七九米飲空心服隨兒大小加減

樗根皮散 治小兒膿血痢如魚腦後重

臭樗根皮

一分
炒黃

枳殼

半分
麩炒

黃連

半分
去
鬚炒

蕪荑

炒
赤

芍藥

各半
分

右為散每服一錢水一小盞入豉三十粒葱白一莖煎至六分去滓不計時量兒大小加減

鷄屎礬丸 治小兒膿血痢不瘥漸加瘦弱

鷄屎礬

一兩
燒灰

胡粉

一分
炒黃

龍骨

阿膠

搗碎
炒黃

黃連

去
鬚

各一
兩

右為細末煎醋為膏和丸如菜豆大每服以煖漿水下七九日三四服量兒大小加減

石榴皮散 治小兒膿血痢

酸石榴皮

微炒

乾薑

炮製用

黃連

去鬚

訶梨勒

煨去核各一分

右為細散每服半錢空心午後各一米飲調下隨兒

大小加減

乾藍湯

一名吳藍散

治小兒百晬內下痢如魚腦赤白雜痢

腹痛多啼

乾藍葉

升麻

芍藥

各一兩

梔子仁

四枚

右搗篩百晷至二百日兒每一錢以水半盞入香豉七枚薤白一莖煎至三分去滓分溫三服隨兒大小加減食前服一方有龍骨

如金散

治小兒瀉痢頻併不食多渴膿血相雜腹中

疼痛裏急後重心燥身熱

甘草

半兩炙

烏梅

罌粟殼

三十箇蜜炙

陳皮

一分

右咬咀為散三歲一錢水半盞煎三分去滓食前服
忌魚腥油膩肥甜等物一方用枳殼無烏梅

白石脂散 治小兒腸澼下膿血

白石脂

燒令赤一分

亂髮

燒灰一分

甘草

炙半兩

右為細末每服一字至半錢早晨午後各一服米飲

調下隨兒大小加減

如聖散 治小兒臟毒久痢下膿血

鉛丹

半錢

硃砂

皂子大

膩粉

一錢

甘草

五分

右研為末用好棗一枚去核入在棗內用大麥麪裹
塘火燒香熟為度去麪研為粉每一枚棗分兩服煎
槐花湯調下日二

治小兒膿血痢每日三二十行立效方

一名捷散方見
本門赤白痢類

治小兒水氣腹腫無下痢膿血小便澀

用葶藶子半兩微炒搗如泥以棗肉和搗為丸如菜
豆大每服五丸棗湯下空心晚後各一量兒大小加
減服之

治小兒久痢膿血濕熱方

用艾葉伍升以水一斗煮取一升半分三服

治小兒下痢膿血日夜無度腹痛裏急後重

罌粟殼

去穰
梗炙

人參

陳皮

甘草

炙

地榆

阿膠

搗碎

木香


各等
分

炙燥

右為麤末一歲每服二錢水一盞煎至四分去滓溫

服如冷痢純白即加乾薑炮等分如熱痢純赤即加

黃連炒等分忌一切毒物



普濟方卷三百九十七